

LÍNEA ANTIBIÓTICOS



GANAFORT
MEDICINAVETERINARIA



AC21-LA

De amplio espectro | Inyectable

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina clorhidrato.....21 g.
Cloruro de Magnesio.....4,8 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Bovinos: Carbunco sintomático bacteriano.
Fiebre de transporte. Hemoglobinuria.
Mastitis. Neumonías. Metritis. Enteritis.
Ovinos: Carbunco sintomático bacteriano.
Neumonías.
Porcinos: Neumonías. Metritis. Septicemias.

PRESENTACIÓN

Frasco de 50 ml. y 250 ml.

VIA: I.M. profunda.



BOVINOS



PORCINOS



OVINOS



AC 21- L.A PLUS

Antibiótico | Antiinflamatorio
Larga acción

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina clorhidrato.....21 g.
Diclofenac sódico.....0.50 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

De amplio espectro, para el control de gérmenes Gram Positivos y Gram Negativos, algunas especies de micoplasmas, protozoarios y rickettsias.

PRESENTACIÓN

Frascos 50 y 250 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



OVINOS



PORCINOS



CAPRINOS



TILMICOSINA DUO

Antibiótico | Antiinflamatorio | Analgésico

COMPOSICIÓN

Tilmicosina (fosfato).....30 g.
Diclofenac sódico.....5 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones susceptibles a Tilmicosina, específicamente neumonía, queratoconjuntivitis y pietín.

PRESENTACIÓN

Frasco 100 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS



ESTREPTO PENI II

De amplio espectro | inyectable

COMPOSICIÓN

Frasco ampolla con polvo
Penicilina Sódica.....2.550.000 UI.
Penicilina Benzatínica 2.450.000 UI.
Sulfato de Estreptomicina.....2.1 mg.
Dipirona sódica.....1950 mg.
Fco ampolla con solvente: Lidocaína clorhidrato33 mg.
Vitamina C.....260 mg.
Ácido cítrico.....45 mg.
Vehículo csp.....10 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de afecciones producidas por gérmenes sensibles a la asociación antibiótica penicilina y estreptomicina, como neumonía, actinomicosis, gangrena gaseosa, cólera aviar, mastitis, conjuntivitis, etc.

PRESENTACIÓN

Polvo: frasco de 25 ml.

Solvente: frasco de 15 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



PORCINOS



OVINOS



EQUINOS



TILMICOSIN FORTE

Antibiótico | Antiinflamatorio |
Analgésico | Antipirético |
Antimicrobiano

COMPOSICIÓN

Tilmicosina (fosfato).....30 g.
Flunixin (meglumina):9 g.
Vehículo c.s.p.:100 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la tilmicosina, como neumonía de los terneros, enfermedad respiratoria de los bovinos. Fiebre de transporte asociada a la *Pasteurella haemolytica* y *Pasteurella multocida*. Queratoconjuntivitis infecciosa asociada a *Moraxella bovis*. Pododermatitis necrótica (Pietín) asociada a *Fusobacterium necrophorum*, *Porphyromonas asaccharolytica* y *Prevotella intermedia*.

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 ml.

Estuche x 6u. de 10 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS



TILMICOSINA 30%

Inyectable

COMPOSICIÓN

Tilmicosina (como fosfato).....30 g.
Vehículos c.s.p.:100 ml.

INDICACIONES

Infecciones causadas por gérmenes susceptibles a la Tilmicosina, específicamente neumonía, queratoconjuntivitis y pietín en bovinos.

PRESENTACIÓN

Frasco 100 ml.

Estuche x 6u. de 10 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS





FLORFENICOL Inyectable

COMPOSICIÓN

Florfenicol300 mg.
Vehículo c.s.p.....1 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones por
gérmenes susceptibles al
florfenicol en bovinos.
Enfermedades respiratorias,
diarreas de los terneros,
neumoenteritis, pietín
y queratoconjuntivitis.

PRESENTACIÓN

Frasco 100 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



CEFTIOFUR RTU 5%

De amplio espectro | inyectable

COMPOSICIÓN

Ceftiofur dorhidrato
(equivalente a ceftiofur):5,00 g.
Vehículo c.s.p:100 ml.

INDICACIONES

Bovinos: enfermedades respiratorias
(fiebre de embarque o neumonía).
Infecciones a gérmenes susceptibles,
pietín (necrobacilosis o foot rot).
Porcinos: enfermedades respiratorias
porcinas. Equinos: enfermedades
infecciosas respiratorias.

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 ml.

VIA: I.M. profunda o S.C.



BOVINOS



PORCINOS



EQUINOS



TILOSINA Inyectable

COMPOSICIÓN

Tilosina (como tartarato).....20 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Bovinos: Neumonía. Septicemia hemorrágica.
Fiebre de transporte. Pietín. Mastitis. Metritis.
Leptospirosis. Estreptococias. Estafilococias.
Infecciones bacterianas secundarias por gérmenes
sensibles. Porcinos: Erisipela. Neumonía. Disentería
vibriónica. Artritis a Mycoplasma. Leptospirosis.
Mastitis. Metritis. Estreptococias. Estafilococias.
Infecciones bacterianas secundarias por gérmenes
sensibles.

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 ml. y de 250 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



PORCINOS



FORT SPRAY COLIRIO Antibiótico | Antiséptico

COMPOSICIÓN

Cloruro de benzalconio0.01 g.
Neomicina sulfato.....0.35 g.
Fenilefrina.....0.20 g.
Violeta de metilo.....0.06 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Rociar tejidos lesionados y alrededores.
Pulverizar el ojo enfermo por 3 días en
bovinos, equinos, ovinos y porcinos.

PRESENTACIÓN

Envase con spray de 250 ml.



BOVINOS



PORCINOS



OVINOS



EQUINOS



GANAMAST S Jeringa Secado

COMPOSICIÓN

Cloxacilina (como sal benztínica)...500 mg.
Vehículo c.s.p:10 g.

INDICACIONES

Prevención de mastitis producidas por
gérmenes sensibles en vacas lecheras
mediante tratamiento al secado.

PRESENTACIÓN

24 unidades x 10 g.

VIA: Intramamaria.



BOVINOS



GANAMAST A Jeringa Mastitis Aguda

COMPOSICIÓN

Cloxacilina (como sal sódica):.....200 mg.
Ampicilina (como sal sódica):75 mg.
Vehículo c.s.p:10 g.

INDICACIONES

Mastitis a gérmenes sensibles, en bovinos
en lactación.

PRESENTACIÓN

24 unidades x 10 g.

VIA: Intramamaria.



BOVINOS



ESTREPTOPEN 20

Antibiótico | Listo para usar

COMPOSICIÓN

Penicilina Procaína20.000.000 UI.
Dihidroestreptomicina sulfato.....20 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas
por gérmenes susceptibles a Penicilina
y/o Estreptomicina.

PRESENTACIÓN

Frasco 50 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



OVINOS



PORCINOS

