

VADEMÉCUM

LÍNEA ANTIPARASITARIO



GANAFORT
MEDICINA VETERINARIA



GANAFEN
Uso interno | oral

COMPOSICIÓN

Fenbendazol.....10 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Antiparasitario de amplio espectro para parásitos gastrointestinales redondos, incluyendo el estado hipobiótico de la Ostertagia, y parásitos pulmonares.

PRESENTACIÓN
Envase de 5 litros.

VIA: Oral.



TRICLABENDAZOL 10%

COMPOSICIÓN

Triclabendazol.....10 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Infestaciones de fasciola hepática y fasciola gigantea adultas e inmaduras en ovinos y bovinos.

PRESENTACIÓN
Envase de 1 y 5 litros.

VIA: Oral.



RICOBENDAZOL 15%
Inyectable

COMPOSICIÓN

Ricobendazol:15 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Antiparasitario interno de amplio espectro, efectivo contra nematodos gastrointestinales y pulmonares en bovinos, con acción sobre parásitos adultos, larvas y huevos.

PRESENTACIÓN
Envase de 500 ml.

VIA: S.C.



GANAFORT POUR ON
Uso externo

COMPOSICIÓN

Cipermetrina:6,00 g.
Ethion:..... 24,00 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Indicaciones para el control y tratamiento de infestaciones de haematobia irritans (mosca de los cuernos), como repelente de Stomoxys calcitrans (mosca brava), tabaníidos, moscas y mosquitos, y para el control de piojos Haematopinus eurysternus. Solenopotes capillatus.

PRESENTACIÓN
Envase de 1 y 5 litros.

VIA: En la cruz o región dorso lumbar.



FORT POUR ON
Uso externo

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....5 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Para el control y tratamiento de las infestaciones por Haematobia irritans (mosca de los cuernos) en bovinos. Tratamiento y control de piojos chupadores y masticadores en bovinos, ovinos y porcinos.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 y 5 litros.

VIA: En la cruz o región dorso lumbar.



FORT POUR ON
Potente

COMPOSICIÓN

Cipermetrina..... 5 g.
Butóxido de piperonilo..... 5 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Para el control y tratamiento de las infestaciones por Haematobia irritans (mosca de los cuernos) en bovinos. Tratamiento y control de piojos chupadores y masticadores en bovinos, ovinos y porcinos.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 y 5 litros.

VIA: En la cruz o región dorso lumbar.





FORT PLATA Aerosol

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....0.4 g.
DDVP1.6 g.
Butóxido de piperonilo.....0.4 g.
Sulfadiazina Plata:0.1 g.
Aluminio en polvo:.....5.0 g.
Vehículo c.s.p:.....100 g.

INDICACIONES

Preventivo y curativo de las miasis (bichera) en bovinos, equinos, ovinos y caninos. No usar en felinos. Repele las moscas y favorece la cicatrización.

PRESENTACIÓN

Envase de 400 ml.



IVERFORT Injectable

COMPOSICIÓN

Ivermectina:.....1 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Endectocida para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares y renales, ácaros productores de la sarna, piojos chupadores y estados larvarios de dípteros causantes de miasis en bovinos y porcinos. Ayuda en el control de piojos masticadores.

PRESENTACIÓN

Frasco 500 ml.

VIA: S.C.



CURABICHERAS Spray

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....0.5 g.
DDVP:1 g.
Vehículo c.s.p:100 g.
Relación concentrado/propelente 60/40ml.

INDICACIONES

Antiparasitario externo, larvicio, antimías Preventivo y curativo de bicheras (miasis) ico. en heridas accidentales o por descorne, de castración, para las especies domésticas. scole,

PRESENTACIÓN

Envase 250 ml.



FORTEQUINOS Pasta Oral

COMPOSICIÓN

Ivermectina:.....1.2 g.
Praziquantel:15 g.
Vehículo c.s.p.....100 g.

INDICACIONES

Antiparasitario de amplio espectro indicado para el tratamiento de las parasitosis de los equinos.

PRESENTACIÓN

Jeringas por 10 y 30 g.

VIA: Oral



Sólo para exportación

FORMAX 1%

COMPOSICIÓN

Doramectina:.....1g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Endectocida para el control simultáneo de parasitosis internas y externas en bovinos, ovinos y porcinos

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: I.M o S.C.



Sólo para exportación

FORMAX 3,5%

COMPOSICIÓN

Doramectina:.....3,5 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Endectocida para el control simultáneo de parasitosis internas y externas en bovinos, ovinos y porcinos

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: I.M o S.C.





Sólo para exportación

GANAMECTIN 3.15%+ ADE

COMPOSICIÓN

Ivermectina..... 3.15 g.
 Vitamina A Palmitato.. 20.000.000 UI.
 Vitamina D3..... 2.000.000 UI.
 Vitamina E Acetato2.000 UI.
 Vehículo c.s.p100 ml.

INDICACIONES:

Endectocida. Control y tratamiento simultáneo de parasitos internas y externas.

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS

OVINOS



Sólo para exportación

GANAMECTIN 3.15% + ADE + NANDROLONA

COMPOSICIÓN

Ivermectina..... 3.15 g.
 Nandrolona (decanoato).....1 g.
 Vitamina A Palmitato ...20.000.000 UI.
 Vitamina D3..... 2.000.000 UI.
 Vitamina E2.000 UI.
 Vehículo c.s.p100 ml.

INDICACIONES:

Endectocida. Control y tratamiento simultáneo de parasitos internas y externas.

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS

OVINOS



CURABICHERAS Antimiásico en Pasta

COMPOSICIÓN

Cipermetrina..... 0.08 g.
 Cloruro de benzalconio..... 0.20 g.
 DDVP..... 2.50 g.
 Vehículo c.s.p.....100 g.

INDICACIONES

Curabichera antimiásico, con acción residual y repelente de moscas. Antiséptico local. Evita reinfecciones, favorece cicatrización. Preventivo y curativo de las bicheras, descole, castraciones, descorne y ombligo del recién nacido.

PRESENTACIÓN

Pasta por 1 kg.

Uso externo exclusivamente



BOVINOS

PORCINOS

OVINOS

EQUINOS



CURABICHERAS Antimiásico en Pasta

COMPOSICIÓN

Cipermetrina..... 0.08 g.
 Cloruro de benzalconio..... 0.20 g.
 DDVP..... 2.50 g.
 Vehículo c.s.p.....100 g.
 Sulfadiazina de plata.....1 g.
 Aluminio en polvo5 g.

INDICACIONES

Curabichera antimiásico, con acción residual y repelente de moscas. Antiséptico local. Evita reinfecciones, favorece cicatrización. Preventivo y curativo de las bicheras, descole, castraciones, descorne y ombligo del recién nacido.

PRESENTACIÓN

Pomo por 200 g.

Uso externo exclusivamente



BOVINOS

PORCINOS

OVINOS

EQUINOS

ANTIDIARREICO ORAL Bacteriostático intestinal

COMPOSICIÓN

Ftalilsulfatiazol..... 2500 mg.
 Dihidroestreptomicina Sulfato 500 mg.
 Carbón café..... 500 mg.
 Dimetilpolisiloxano.....1000 mg.
 Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Control y tratamiento de diarreas neonatales polimicrobianas en potrillos, lechones y terneros. Procesos gastrointestinales en todas las especies animales, procesos infecciosos alimenticios.

PRESENTACIÓN

Envase de 1L.

VIA: ORAL.



CANINOS

FELINOS





LEVAMISOLE GANAFORT Injectable

COMPOSICIÓN

Levamisole (dorhidrato)..... 7.5 g.
Vehículo c.s.p 100 ml.

INDICACIONES:

Antiparasitario interno de amplio espectro eficaz contra parásitos gastrointestinales y pulmonares.

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: I.M o S.C.



ANTITÓXICO MULTIVALENTE

COMPOSICIÓN

Clorhidrato Difenhidramina..... 0.95 g.
Niketamida..... 8 g.
Tiosulfato de sodio..... 30 g.
Vehículo c.s.p:..... 100 ml.

INDICACIONES

Intoxicaciones agudas y crónicas, en los casos de intoxicación cianogenética, duraznillo, sorgo, romerillo, lino y otros vegetales tóxicos. En anafilaxis, picaduras de insectos, reacciones alérgicas por medicamentos: antibióticos y suero para bovinos y equinos.

PRESENTACIÓN

Frasco 20 ml.

VIA: E.V. Lenta. o I.M.



GANAMAG Mineralizante magnesiano

COMPOSICIÓN

Gluconato de magnesio..... 30 g.
Gluconato de calcio:..... 5 g.
Gluconato de cobre:..... 0.65 g.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.

INDICACIONES

Para casos de hipomagnesemias y estados carenciales por oligoelementos. Mejora la asimilación de nutrientes. Coadyuvante del metabolismo post destete. Contrarresta efectos de stress de traslado, vacunaciones. Mejora el engorde.

PRESENTACIÓN

Frasco 500 ml.

VIA: S.C. o E.V.



GANASEL ADE Suplemento vitamínico mineral

COMPOSICIÓN

Selenito de sodio 219 mg.
Vitamina A Palmitato..... 2.600.000 UI.
Vitamina D2 Colecalciferol 720.000 UI.
Vitamina E Acetato de alfa
tocopherol..... 1360 UI.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.
Suministra 1 mg de selenio por ml.

INDICACIONES

Hipovitaminosis A, D, E, hiposelenosis.

PRESENTACIÓN

Frasco 500 ml.

VIA: S.C. o I.M.

