

LÍNEA INYECTABLES



GANAFORT
MEDICINA VETERINARIA



HEPATOPROTECTOR Desintoxicante | Inyectable

COMPOSICIÓN

Ácido Tióctico..... 0.255 g.
Metionina..... 1 g.
L-Glicina..... 0.5 g.
Vitamina B12..... 0.5 mg.
Glucosa 10 g.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.

INDICACIONES

En cuadros de insuficiencia hepática y como desintoxicante en procesos tóxicos. Reestablecedor coadyuvante de enfermedades infecciosas. Inapetencia.

PRESENTACIÓN
Frasco de 100 ml.

VIA: E.V. Lenta.



GANASEL ADE Suplemento vitamínico mineral

COMPOSICIÓN

Selenito de sodio 219 mg.
Vitamina A Palmitato.....2.600.000 UI.
Vitamina D2 Colecalciferol 720.000 UI.
Vitamina E Acetato de alfa
tocoferol..... 1360 UI.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.
Suministra 1 mg de selenio por ml.

INDICACIONES

Hipovitaminosis A, D, E, hiposelenosis.

PRESENTACIÓN
Frasco 500 ml.

VIA: S.C. o I.M.



ANTITÓXICO MULTIVALENTE

COMPOSICIÓN

Clorhidrato Difenhidramina.....0.95 g.
Niketamina.....8 g.
Tiosulfato de sodio.....30 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Intoxicaciones agudas y crónicas, en los casos de intoxicación cianogenética, duraznillo, sorgo, romerillo, lino y otros vegetales tóxicos. En anafilaxis, picaduras de insectos, reacciones alérgicas por medicamentos: antibióticos y suero para bovinos y equinos.

PRESENTACIÓN
Frasco 20 ml.

VIA: E.V. Lenta. o I.M.



GANAMAG

Mineralizante magnesiano

COMPOSICIÓN

Gluconato de magnesio.....30 g.
Gluconato de calcio:.....5 g.
Gluconato de cobre:..... 0.65 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Para casos de hipomagnesemias y estados carenciales por oligoelementos. Mejora la asimilación de nutrientes. Coadyuvante del metabolismo post destete. Contrarresta efectos de stress de traslado, vacunaciones. Mejora el engorde.

PRESENTACIÓN
Frasco 500 ml.

VIA: S.C. o E.V.



GANASEL ADE Suplemento vitamínico mineral

COMPOSICIÓN

Selenito de sodio 219 mg.
Vitamina A Palmitato.....2.600.000 UI.
Vitamina D2 Colecalciferol 720.000 UI.
Vitamina E Acetato de alfa
tocoferol..... 1360 UI.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.
Suministra 1 mg de selenio por ml.

INDICACIONES

Hipovitaminosis A, D, E, hiposelenosis.

PRESENTACIÓN
Frasco 500 ml.

VIA: S.C. o I.M.



GANASAN

Mineralizante vitamínico c/B12 - ADE

COMPOSICIÓN

Cloruro de calcio.....3.52 g.
Hipofosfato de magnesio..... 6.86 g.
Vitamina A Palmitato 1g.
Vitamina E Acetato..... 1.25 g.
Vitamina D2..... 0.042 g.
Vitamina B12..... 0.0075 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Hipocalcemia, estados carenciales de magnesio y fósforo, avitaminosis A-D-E y B12, estados de preñez y post-parto, rachitismo, destete y coadyuvante en casos de stress.

PRESENTACIÓN
Frasco 250 ml. y 500 ml.

VIA: I.M. o S.C.



FORT 500

Potente

COMPOSICIÓN

Gluconato de calcio.....15 g.
Cloruro de magnesio 7 g.
Cloruro de potasio 0.26 g.
Cloruro de sodio.....0.85 g.
Glucosa.....20 g.
Ácido bórico.....2.18 g.
Vehículo c.s.p 100 ml.

INDICACIONES

Estados de intenso metabolismo como lactancia, preñez, paresia de la parturienta o fiebre de la leche. En casos de tetanía de la lactancia e hipocalcemia. Fiebre de los lactantes.

PRESENTACIÓN
Frasco 500 ml.

VIA: E.V. Lenta o S.C.





DEXAMETASONA
Antiinflamatorio Esteroide

COMPOSICIÓN

Dexametasona base.....0.2 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Se utiliza en casos de estrés.
Cetosis de los bovinos. Dermatitis no específicas tales como eczemas, sintomatología alérgica. Coadyuvante en enfermedades infecciosas que cursan con inflamaciones severas (mastitis, metritis).
Inflamaciones no infecciosas como bursitis, tendinitis, miositis.

PRESENTACIÓN
Frasco 10 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS EQUINOS



RESOLUTIVO
Ioduro de sodio

COMPOSICIÓN

Ioduro de sodio.....60 g.
Vehículo c.s.p100 ml.

INDICACIONES
Actinomicosis y actinobacilos (lengua de palo)

PRESENTACIÓN
Frasco 50 ml.

VIA :
E.V. Lenta.



ANTITÓXICO ANTICIÁNICO

COMPOSICIÓN

Hiposulfito de sodio pentahidrato...30 g.
Nitrito de sodio anhidro.....10 g.
Cafeína..... 2 g.
Niketamida..... 2 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Intoxicaciones por ingestión de vegetales agresivos.

PRESENTACIÓN
Frasco 50 ml.

VIA: E.V. Lenta. o I.M.



BOVINOS PORCINOS OVINOS



GANAPROST
Prostaglandina | Regulador celo

COMPOSICIÓN

Cloprostenol sódico.....0.075 mg.
Vehículo c.s.p.....1 ml.

INDICACIONES

Sincronización del celo, desórdenes funcionales del ciclo estral, inducción al parto o al aborto y desórdenes funcionales de los ovarios. Patologías uterinas postparto, fase luteal del ciclo estral produce inmediata regresión del cuerpo lúteo, para el comienzo del estro y la ovulación, 1º manifestación del celo a las 48 o 60 horas. post inyección y el momento de inseminación es 76 hs. post inyección. Sincronización e inducción del celo en vacas, vaquillonas y ovejas, inducción al parto en cerdas. Desórdenes ováricos func., anestro post parto o post servicio, celos silentes, irregulares y ciclos anovulatorios cuerpo lútero persistentes, quistes luteos. Enfermedades uterinas post puerperales, endometritis,piometras. Interrupción de la gestación en primer tercio de la misma.

PRESENTACIÓN
Frasco 20 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS PORCINOS OVINOS EQUINOS



SHOCK D2
Mineralizante vitamínico magnesiado

COMPOSICIÓN

Oleato de sodio puro.....0.8 g.
Cloruro de calcio anhidro.....1.157 g.
Cloruro de magnesio hexahidratado.. 0.124 g.
Hipofosfito de calcio..... 4 g.
Hipofosfito de magnesio..... 3 g.
Vitamina D2..... 25.000.000 UI.
Vitamina B12..... 0.03 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

En hipocalcemias, raquitismo, estados carentiales de fósforo y magnesio, reconstituyente en avitaminosis D2 y B12, preñez, destete, post parto, etc.

PRESENTACIÓN
Frasco 10 ml.

VIA: I.M o S.C.



COBRE
Suplemento mineral



COMPOSICIÓN
Glicinato de cobre monohidratado.....9.08 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.
Suministra 25 mg. de Cobre por ml.

INDICACIONES

Mineralizante para bovinos. Prevención y tratamiento de las deficiencias de cobre que no presentan evidencias de enfermedades infecciosas ni daño hepático. No mezclar con otros zooterápicos que contengan Zinc o Molibdeno. No en animales con hipercupremia. No suministrar con cobre en la dieta.

PRESENTACIÓN
Frasco de 250 ml.

VIA: S.C.





ANTIDIARRÉICO

COMPOSICIÓN

Enrofloxacina:..... 2.5 g.
Bencetimida clorhidrato.....0.0165 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Diarreas de origen bacteriano, viral o parasitario, complicadas con infecciones bacterianas en bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.

PRESENTACIÓN

12 unidades de 20 ml.

VIA: S.C. o I.M.



GANEDEM Diurético | Antiinflamatorio esteroide

COMPOSICIÓN

Furosemida 5 g.
Dexametasona fosfato....0.063 g.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.

INDICACIONES

Edema de ubre post parto de los bovinos. Edema de diversos orígenes en bovinos, ovinos y equinos deportivos. No tiene actividad antiparasitaria ni antimicrobiana.

PRESENTACIÓN

12 unidades de 25 ml.

VIA: I.M. o S.C.



Solo para exportación NANDROLONA DECANOATO Androgénico hormonal

COMPOSICIÓN

Nandrolona Decanoato....20 g.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.

INDICACIONES

Terapia androgénica de reposición. En la hipofunción endocrina (hipogonadismo), disminución de la espermogénesis. Coadyuvante en la curación de fracturas. Estimulación de la eritropoyesis y del apetito.

PRESENTACIÓN

Frasco de 10 ml.

VIA: I.M. Profundo.



DEXAMETASONA L.A. GANAFORT De larga acción | Inyectable

COMPOSICIÓN

Dexametasona fosfato..... 0.10 g.
Dexametasona acetato.....0.20 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Artritis. Sinovitis. Hidrartrosis. Miositis. Afecciones reumáticas. Acetonemia. Alergias y anafilaxia. Shock quirúrgico. Coadyuvante en casos de mastitis. Enfermedades bacterianas asociadas a tratamiento antibiótico específico. En todas las indicaciones de la terapia corticosteroide.

PRESENTACIÓN

Frasco 10 ml. y 50 ml.

VIA: I.M.

