



VADEMÉCUM

LÍNEA DE PRODUCTOS



GANAFORT
MEDICINA VETERINARIA

LÍNEA ANTIPARASITARIO



GANAFEN

Uso interno | oral

COMPOSICIÓN

Fenbendazol.....10 g.
Vehículo c.s.p.:.....100 ml.

INDICACIONES

Antiparasitario de amplio espectro para parásitos gastrointestinales redondos, incluyendo el estado hipobiótico de la Ostertagia, y parásitos pulmonares.

PRESENTACIÓN

Envase de 5 litros.

VIA: Oral.



TRICLABENDAZOL 10%

COMPOSICIÓN

Triclabendazol.....10 g.
Vehículo c.s.p.:.....100 ml.

INDICACIONES

Infestaciones de fasciola hepática y fasciola gigantea adultas e inmaduras en ovinos y bovinos.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 y 5 litros.

VIA: Oral.



RICOBENDAZOL 15% Injectable

COMPOSICIÓN

Ricobendazol:15 g.
Vehículo c.s.p.:.....100 ml.

INDICACIONES

Antiparasitario interno de amplio espectro, efectivo contra nematodos gastrointestinales y pulmonares en bovinos, con acción sobre parásitos adultos, larvas y huevos.

PRESENTACIÓN

Envase de 500 ml.

VIA: S.C.



GANAFORT POUR ON

Uso externo

COMPOSICIÓN

Cipermetrina:6,00 g.
Ethion:..... 24,00 g.
Vehículo c.s.p.:.....100 ml.

INDICACIONES

Indicaciones para el control y tratamiento de infestaciones de haematobia irritans (mosca de los cuernos), como repelente de Stomoxys calcitrans (mosca brava), tabaníidos, moscas y mosquitos, y para el control de piojos Haematopinus eurysternus. Solenopotes capillatus.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 y 5 litros.

VIA: En la cruz o región dorso lumbar.



FORT POUR ON

Uso externo

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....5 g.
Vehículo c.s.p.:.....100 ml.

INDICACIONES

Para el control y tratamiento de las infestaciones por Haematobia irritans (mosca de los cuernos) en bovinos. Tratamiento y control de piojos chupadores y masticadores en bovinos, ovinos y porcinos.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5 litros.

VIA: En la cruz o región dorso lumbar.



FORT POUR ON Potente

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....5 g.
Butóxido de piperonilo.....5 g.
Vehículo c.s.p.:.....100 ml.

INDICACIONES

Para el control y tratamiento de las infestaciones por Haematobia irritans (mosca de los cuernos) en bovinos. Tratamiento y control de piojos chupadores y masticadores en bovinos, ovinos y porcinos.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5 litros.

VIA: En la cruz o región dorso lumbar.





FORT PLATA Aerosol

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....0.4 g.
DDVP1.6 g.
Butóxido de piperonilo.....0.4 g.
Sulfadiazina Plata:0.1 g.
Aluminio en polvo:.....5.0 g.
Vehículo c.s.p:.....100 g.

INDICACIONES

Preventivo y curativo de las miasis (bichera) en bovinos, equinos, ovinos y caninos. No usar en felinos. Repele las moscas y favorece la cicatrización.

PRESENTACIÓN

Envase de 400 ml.



IVERFORT Injectable

COMPOSICIÓN

Ivermectina:.....1 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.

INDICACIONES

Endectocida para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares y renales, ácaros productores de la sarna, piojos chupadores y estados larvarios de dípteros causantes de miosis en bovinos y porcinos. Ayuda en el control de piojos masticadores.

PRESENTACIÓN

Frasco 500 ml.

VIA: S.C.



CURABICHERAS Spray

COMPOSICIÓN

Cipermetrina.....0.5 g.
DDVP:1 g.
Vehículo c.s.p:100 g.
Relación concentrado/propelente 60/40ml.

INDICACIONES

Antiparasitario externo, larvicio, antimíasis. Preventivo y curativo de bicheras (miosis) ico. en heridas accidentales o por descorne, de castración, para las especies domésticas. scole,

PRESENTACIÓN

Envase 250 ml.



FORTEQUINOS Pasta Oral

COMPOSICIÓN

Ivermectina:.....1.2 g.
Praziquantel:15 g.
Vehículo c.s.p.....100 g.

INDICACIONES

Antiparasitario de amplio espectro indicado para el tratamiento de las parasitosis de los equinos.

PRESENTACIÓN

Jeringas por 10 y 30 g.

VIA: Oral



Sólo para exportación

FORMAX 1%

COMPOSICIÓN

Doramectina:.....1g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Endectocida para el control simultáneo de parasitosis internas y externas en bovinos, ovinos y porcinos

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: I.M o S.C.



Sólo para exportación

FORMAX 3,5%

COMPOSICIÓN

Doramectina:.....3,5 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Endectocida para el control simultáneo de parasitosis internas y externas en bovinos, ovinos y porcinos

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: I.M o S.C.





Sólo para exportación

GANAMECTIN 3.15%+ ADE

COMPOSICIÓN

Ivermectina..... 3.15 g.
 Vitamina A Palmitato.. 20.000.000 UI.
 Vitamina D3..... 2.000.000 UI.
 Vitamina E Acetato2.000 UI.
 Vehículo c.s.p100 ml.

INDICACIONES:

Endectocida. Control y tratamiento simultáneo de parasitosis internas y externas.

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS



OVINOS



Sólo para exportación

GANAMECTIN 3.15% + ADE + NANDROLONA

COMPOSICIÓN

Ivermectina..... 3.15 g.
 Nandrolona (decanoato).....1 g.
 Vitamina A Palmitato ...20.000.000 UI.
 Vitamina D3..... 2.000.000 UI.
 Vitamina E2.000 UI.
 Vehículo c.s.p100 ml.

INDICACIONES:

Endectocida. Control y tratamiento simultáneo de parasitosis internas y externas.

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS



OVINOS



CURABICHERAS Antimiásico en Pasta

COMPOSICIÓN

Cipermetrina..... 0.08 g.
 Cloruro de benzalconio..... 0.20 g.
 DDVP..... 2.50 g.
 Vehículo c.s.p.....100 g.

INDICACIONES

Curabichera antimiásico, con acción residual y repelente de moscas. Antiséptico local. Evita reinfecciones, favorece cicatrización. Preventivo y curativo de las bicheras, descole, castraciones, descorne y ombligo del recién nacido.

PRESENTACIÓN

Pasta por 1 kg.

Uso externo exclusivamente



BOVINOS

PORCINOS

OVINOS

EQUINOS



CURABICHERAS Antimiásico en Pasta

COMPOSICIÓN

Cipermetrina..... 0.08 g.
 Cloruro de benzalconio..... 0.20 g.
 DDVP..... 2.50 g.
 Vehículo c.s.p.....100 g.
 Sulfadiazina de plata.....1 g.
 Aluminio en polvo5 g.

INDICACIONES

Curabichera antimiásico, con acción residual y repelente de moscas. Antiséptico local. Evita reinfecciones, favorece cicatrización. Preventivo y curativo de las bicheras, descole, castraciones, descorne y ombligo del recién nacido.

PRESENTACIÓN

Pomo por 200 g.

Uso externo exclusivamente



BOVINOS

PORCINOS

OVINOS

EQUINOS

ANTIDIARREICO ORAL Bacteriostático intestinal

COMPOSICIÓN

Ftalilsulfatiazol..... 2500 mg.
 Dihidroestreptomicina Sulfato 500 mg.
 Carbón café..... 500 mg.
 Dimetilpolisiloxano.....1000 mg.
 Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Control y tratamiento de diarreas neonatales polimicrobianas en potrillos, lechones y terneros. Procesos gastroenteríticos en todas las especies animales, procesos infecciosos alimenticios.

PRESENTACIÓN

Envase de 1L.

VIA: ORAL.



EQUINOS



PORCINOS



BOVINOS



OVINOS



CANINOS



FELINOS

HEPATOPROTECTOR

Desintoxicante | Inyectable

COMPOSICIÓN

Ácido Tióctico..... 0.255 g.
 Metionina..... 1 g.
 L-Glicina..... 5 g.
 Vitamina B12..... 0.5 mg.
 Glucosa10 g.
 Vehículo c.s.p..... 100 ml.

INDICACIONES

En cuadros de insuficiencia hepática y como desintoxicante en procesos tóxicos. Reestablecedor coadyuvante de enfermedades infecciosas. Inapetencia.

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 ml.

VIA: E.V. Lenta.



BOVINOS

EQUINOS





LEVAMISOLE GANAFORT Injectable

COMPOSICIÓN

Levamisole (clorhidrato)..... 75 g.
Vehículo c.s.p 100 ml.

INDICACIONES:

Antiparasitario interno de amplio espectro eficaz contra parásitos gastrointestinales y pulmonares.

PRESENTACIÓN

Frasco de 500 ml.

VIA: I.M o S.C.



BOVINOS PORCINOS OVINOS



ANTITÓXICO MULTIVALENTE

COMPOSICIÓN

Clorhidrato Difenhidramina..... 0.95 g.
Niketamida..... 8 g.
Tiosulfato de sodio..... 30 g.
Vehículo c.s.p:..... 100 ml.

INDICACIONES

Intoxicaciones agudas y crónicas, en los casos de intoxicación cianogenética, duraznillo, sorgo, romerillo, lino y otros vegetales tóxicos. En anafilaxis, picaduras de insectos, reacciones alérgicas por medicamentos: antibióticos y suero para bovinos y equinos.

PRESENTACIÓN

Frasco 20 ml.

VIA: E.V. Lenta. o I.M.



BOVINOS EQUINOS



GANAMAG Mineralizante magnesiano

COMPOSICIÓN

Gluconato de magnesio..... 30 g.
Gluconato de calcio:..... 5 g.
Gluconato de cobre..... 0.65 g.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.

INDICACIONES

Para casos de hipomagnesemias y estados carenciales por oligoelementos. Mejora la asimilación de nutrientes. Coadyuvante del metabolismo post destete. Contrarresta efectos de stress de traslado, vacunaciones. Mejora el engorde.

PRESENTACIÓN

Frasco 500 ml.

VIA: S.C. o E.V.



GANASEL ADE Suplemento vitamínico mineral

COMPOSICIÓN

Selenito de sodio 219 mg.
Vitamina A Palmitato..... 2.600.000 UI.
Vitamina D2 Colecalciferol 720.000 UI.
Vitamina E Acetato de alfa
tocopherol..... 1360 UI.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.
Suministra 1 mg de selenio por ml.

INDICACIONES

Hipovitaminosis A, D, E, hiposelenosis.

PRESENTACIÓN

Frasco 500 ml.

VIA: S.C. o I.M.





GANASAN
Mineralizante vitamínico
c/B12 - ADE

COMPOSICIÓN

Cloruro de calcio.....	3.52 g.
Hipofosfato de magnesio.....	6.86 g.
Vitamina A Palmitato	1g.
Vitamina E Acetato.....	1.25 g.
Vitamina D2.....	0.042 g.
Vitamina B12.....	0.0075 g.
Vehículo c.s.p.....	100 ml.

INDICACIONES

Hipocalcemia, estados carenciales de magnesio y fósforo, avitaminosis A-D-E y B12, estados de preñez y post-parto, raquitismo, destete y coadyuvante en casos de stress.

PRESENTACIÓN
Frasco 250 ml. y 500 ml.

VIA: I.M. o S.C.



BOVINOS PORCINOS OVINOS EQUINOS



FORT 500
Potente

COMPOSICIÓN

Gluconato de calcio.....	15 g.
Cloruro de magnesio	7 g.
Cloruro de potasio	0.26 g.
Cloruro de sodio.....	0.85 g.
Glucosa.....	20 g.
Ácido bórico.....	2.18 g.
Vehículo c.s.p	100 ml.

INDICACIONES

Estados de intenso metabolismo como lactancia, preñez, paresia de la parturienta o fiebre de la leche. En casos de tetania de la lactancia e hipocalcemia. Fiebre de los lactantes.

PRESENTACIÓN
Frasco 500 ml.

VIA: E.V. Lenta o S.C.



BOVINOS



DEXAMETASONA
Antiinflamatorio Esteroide

COMPOSICIÓN

Dexametasona base.....	0.2 g.
Vehículo c.s.p:.....	100 ml.

INDICACIONES

Se utiliza en casos de estrés. Cetosis de los bovinos. Dermatitis no específicas tales como eczemas, sintomatología alérgica. Coadyuvante en enfermedades infecciosas que cursan con inflamaciones severas (mastitis, metritis). Inflamaciones no infecciosas como bursitis, tendinitis, miositis.

PRESENTACIÓN
Frasco 10 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS EQUINOS



RESOLUTIVO
Ioduro de sodio

COMPOSICIÓN

Ioduro de sodio.....	60 g.
Vehículo c.s.p	100 ml.

INDICACIONES
Actinomycosis y actinobacilosis (lengua de palo)

PRESENTACIÓN
Frasco 50 ml.

VIA :
E.V. Lenta.



BOVINOS



SHOCK D2
Mineralizante vitamínico magnesiado

COMPOSICIÓN

Oleato de sodio puro.....	0.8 g.
Cloruro de calcio anhidro.....	1.157 g.
Cloruro de magnesio hexahidratado..	0.124 g.
Hipofosfato de calcio.....	4 g.
Hipofosfato de magnesio.....	3 g.
Vitamina D2.....	25.000.000 UI.
Vitamina B12.....	0.03 g.
Vehículo c.s.p:.....	100 ml.

INDICACIONES

En hipocalcemias, raquitismo, estados carenciales de fósforo y magnesio, reconstituyente en avitaminosis D2 y B12, preñez, destete, post parto, etc.

PRESENTACIÓN
Frasco 10 ml.

VIA: I.M o S.C.



PORCINOS OVINOS BOVINOS



ANTITÓXICO ANTICIÁNICO

COMPOSICIÓN

Hiposulfito de sodio pentahidrato...30 g.	
Nitrito de sodio anhídrio.....	10 g.
Cafeína.....	2 g.
Niketamida.....	2 g.
Vehículo c.s.p.....	100 ml.

INDICACIONES

Intoxicaciones por ingestión de vegetales agresivos.

PRESENTACIÓN
Frasco 50 ml.

VIA: E.V. Lenta. o I.M.



BOVINOS PORCINOS OVINOS



**GANAPROST**

Prostaglandina | Regulador celo

COMPOSICIÓNCloprosteno sódico.....0.075 mg.
Vehículo c.s.p.....1 ml.**INDICACIONES**

Sincronización del celo, desórdenes funcionales del ciclo estral, inducción al parto o al aborto y desórdenes funcionales de los ovarios. Patologías uterinas postparto, fase luteal del ciclo estral produce inmediata regresión del cuerpo lúteo, para el comienzo del estro y la ovulación, 1º manifestación del celo a las 48 o 60 horas. post inyección y el momento de inseminación es 76 hs. post inyección. Sincronización e inducción del celo en vacas, vaquillones y ovejas, inducción al parto en cerdas. Desórdenes ováricos func., anestro post parto o post servicio, celos silentes, irregulares y ciclos anovulatorios cuerpo lútero persistentes, quistes luteos. Enfermedades uterinas post puerperales, endometritis, piometras. Interrupción de la gestación en primer tercio de la misma.

PRESENTACIÓN

Frasco 20 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



PORCINOS



OVINOS



EQUINOS

**COBRE**

Suplemento mineral

COMPOSICIÓNGlicinato de cobre monohidratado.....9.08 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.
Suministra 25 mg. de Cobre por ml.**INDICACIONES**

Mineralizante para bovinos. Prevención y tratamiento de las deficiencias de cobre que no presentan evidencias de enfermedades infecciosas ni daño hepático. No mezclar con otros zooterápicos que contengan Zinc o Molibdeno. No en animales con hipercupremia. No suministrar con cobre en la dieta.

PRESENTACIÓN

Frasco de 250 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS

**ANTIDIARREICO****COMPOSICIÓN**Enrofloxacina:.....2.5 g.
Bencetimida clorhidrato.....0.0165 g.
Vehículo c.s.p:.....100 ml.**INDICACIONES**

Diarreas de origen bacteriano, viral o parasitario, complicadas con infecciones bacterianas en bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caninos y felinos.

PRESENTACIÓN

12 unidades de 20 ml.

VIA: S.C. o I.M.



BOVINOS



PORCINOS



OVINOS



EQUINOS



CANINOS



FELINOS

**GANEDEM**

Diurético | Antiinflamatorio esteroide

COMPOSICIÓNFurosemida5 g.
Dexametasona fosfato....0.063 g.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.**INDICACIONES**

Edema de ubre post parto de los bovinos. Edema de diversos orígenes en bovinos, ovinos y equinos deportivos. No tiene actividad antiparasitaria ni antimicrobiana.

PRESENTACIÓN
12 unidades de 25 ml.

VIA: I.M. o S.C.



BOVINOS



EQUINOS



OVINOS

**Sólo para exportación****NANDROLONA DECANATO**
Androgénico hormonal**COMPOSICIÓN**Nandrolona Decanoato....20 g.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.**INDICACIONES**

Terapia androgénica de reposición. En la hipofunción endocrina (hipogenitalismo), disminución de la espermatogénesis. Coadyuvante en la curación de fracturas. Estimulación de la eritropoyesis y del apetito.

PRESENTACIÓN
Frasco de 10 ml.

VIA: I.M. Profundo.



BOVINOS

DEXAMETASONA L.A. GANAFORT

De larga acción | Inyectable

COMPOSICIÓNDexametasona fosfato.....0.10 g.
Dexametasona acetato.....0.20 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.**INDICACIONES**

Artritis. Sinovitis. Hidrartrosis. Miositis. Afecciones reumáticas. Acetonemia. Alergias y anafilaxia. Shock quirúrgico. Coadyuvante en casos de mastitis. Enfermedades bacterianas asociadas a tratamiento antibiótico específico. En todas las indicaciones de la terapia corticosteroide.

PRESENTACIÓN

Frasco 10 ml. y 50 ml.

VIA: I.M.



EQUINOS



CANINOS



FELINOS



BOVINOS



PORCINOS



OVINOS



Sigale los pasos a... GANAFORT



PANES HIDROSOLUBLES
GANAPORT

500 g
PARA 1000 litros de agua
para vacas lecheras, ovejas, cabras, etc.

GANAFORT, el mejor complemento alimenticio para equinos, vacas, ovejas y cabras. NACIDA con motivo de la fermentación de los forrajes prensados.

GANAFORT

ELABORADO POR GANAFORT S.A. Belgrano 22 - Junín





AC21-LA
De amplio espectro | Inyectable

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina clorhidrato.....21 g.
Cloruro de Magnesio.....4,8 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Bovinos: Carbundo sintomático bacteriano.
Fiebre de transporte. Hemoglobinuria.
Mastitis. Neumonías. Metritis. Enteritis.
Ovinos: Carbundo sintomático bacteriano.
Neumonías.
Porcinos: Neumonías. Metritis. Septicemias.

PRESENTACIÓN

Frasco de 50 ml. y 250 ml.

VIA: I.M. profunda.



BOVINOS

PORCINOS

OVINOS

AC 21- L.A PLUS
Antibótico | Antiinflamatorio
Larga acción

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina clorhidrato.....21 g.
Diclofenac sódico.....0,50 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

De amplio espectro, para el control de gérmenes Gram Positivos y Gram Negativos, algunas especies de micoplasmas, protozoarios y rickettsias.

PRESENTACIÓN

Frascos 50 y 250 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



OVINOS



PORCINOS



CAPRINOS

TILMICOSINA DUO
Antibótico | Antiinflamatorio | Analgésico

COMPOSICIÓN

Tilmicosina (fosfato).....30 g.
Diclofenac sódico.....5 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones susceptibles a Tilmicosina, específicamente neumonía, queratoconjuntivitis y pietín.

PRESENTACIÓN

Frasco 100 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS



ESTREPTO PENI II
De amplio espectro | inyectable

COMPOSICIÓN

Frasco ampolla con polvo
Penicilina Sódica2.550.000 UI.
Penicilina Benzatínica 2.450.000 UI.
Sulfato de Estreptomicina.....2.1 mg.
Dipirona sódica.....1950 mg.
Fco ampolla con solvente: Lidocaína clorhidrato33 mg.
Vitamina C.....260 mg.
Ácido cítrico.....45 mg.
Vehículo csp.....10 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de afecciones producidas por gérmenes sensibles a la asociación antibiótica penicilina y estreptomicina, como neumonía, actinomicosis, gangrena gaseosa, cólera aviar, mastitis, conjuntivitis, etc.

PRESENTACIÓN

Polvo: frasco de 25 ml.
Solvente: frasco de 15 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



PORCINOS



OVINOS



TILMICOSIN FORTE
Antibótico | Antiinflamatorio |
Analgésico | Antipirético |
Antimicrobiano

COMPOSICIÓN

Tilmicosina (fosfato):.....30 g.
Flunixin(meglumina):9 g.
Vehículo c.s.p:100 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la tilmicosina, como neumonía de los terneros, enfermedad respiratoria de los bovinos. Fiebre de transporte asociada a la Pasteurella haemolytica y Pasteurella multocida. Queratoconjuntivitis infecciosa asociada a moraxella bovina. Pododermatitis necrótica (Pietín) asociada a fusobacterium necrophorum, porphyromonas assacharolytica y prevotella intermedia.

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 ml.
Estuche x 6u. de 10 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS



TILMICOSINA 30%
Inyectable

COMPOSICIÓN

Tilmicosina (como fosfato)...30 g.
Vehículos c.s.p.:100 ml.

INDICACIONES

Infecciones causadas por gérmenes susceptibles a la Tilmicosina, específicamente neumonía, queratoconjuntivitis y pietín en bovinos.

PRESENTACIÓN

Frasco 100 ml.
Estuche x 6u. de 10 ml.

VIA: S.C.



BOVINOS





FLORFENICOL Inyectable

COMPOSICIÓN

Florfenicol 300 mg.
Vehículo c.s.p..... 1 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones por gérmenes susceptibles al florfenicol en bovinos.
Enfermedades respiratorias, diarreas de los terneros, neumoenteritis, pletin y queratoconjuntivitis.

PRESENTACIÓN

Frasco 100 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS



CEFTIOFUR RTU 5% De amplio espectro | inyectable

COMPOSICIÓN

Ceftiofur clorhidrato
(equivalente a ceftiofur): 5,00 g.
Vehículo c.s.p: 100 ml.

INDICACIONES

Bovinos: enfermedades respiratorias (fiebre de embarque o neumonía). Infecciones a gérmenes susceptibles, pletin (necrobacilosis o foot rot). Porcinos: enfermedades respiratorias porcinas. Equinos: enfermedades infecciosas respiratorias.

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 ml.

VIA: I.M. profunda o S.C.



BOVINOS

PORCINOS

EQUINOS



TILOSINA Inyectable

COMPOSICIÓN

Tilosina (como tartaro) 20 g.
Vehículo c.s.p: 100 ml.

INDICACIONES

Bovinos: Neumonía. Septicemia hemorrágica. Fiebre de transporte. Piefín. Mastitis. Metritis. Leptospirosis. Estreptococcias. Infecções bacterianas secundarias por gérmenes sensibles. Porcinos: Erisipela. Neumonía. Disentería vibrionica. Artritis a Mycoplasma. Leptospirosis. Mastitis. Metritis. Estreptococcias. Estafilococcias. Infecções bacterianas secundarias por gérmenes sensibles.

PRESENTACIÓN

Frasco de 100 ml. y de 250 ml.

VIA: I.M.



BOVINOS

PORCINOS



FORT SPRAY COLIRIO Antibótico | Antiséptico

COMPOSICIÓN

Cloruro de benzalconio 0.01 g.
Neomicina sulfato..... 0.35 g.
Fenilefrina..... 0.20 g.
Violeta de metilo..... 0.06 g.
Vehículo c.s.p..... 100 ml.

INDICACIONES

Rociar tejidos lesionados y alrededores. Pulverizar el ojo enfermo por 3 días en bovinos, equinos, ovinos y porcinos.

PRESENTACIÓN

Envase con spray de 250 ml.



BOVINOS



PORCINOS



OVINOS



EQUINOS



GANAMAST S Jeringa Secado

COMPOSICIÓN

Cloxacilina (como sal benzatínica) ... 500 mg.
Vehículo c.s.p: 10 g.

INDICACIONES

Prevención de mastitis producidas por gérmenes sensibles en vacas lecheras mediante tratamiento al secado.

PRESENTACIÓN

24 unidades x 10 g.

VIA: Intramamaria.



BOVINOS



GANAMAST A Jeringa Mastitis Aguda

COMPOSICIÓN

Cloxacilina (como sal sódica):..... 200 mg.
Ampicilina (como sal sódica): 75 mg.
Vehículo c.s.p: 10 g.

INDICACIONES

Mastitis a gérmenes sensibles, en bovinos en lactación.

PRESENTACIÓN

24 unidades x 10 g.

VIA: Intramamaria.



BOVINOS

LÍNEA BLOQUES

ESTREPTOPEN 20

Antibótico | Listo para usar

COMPOSICIÓN

Penicilina Procaína20.000.000 UI.
Dihidroestreptomicina sulfato.....20 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes susceptibles a Penicilina y/o Streptomicina.

PRESENTACIÓN

Frasco 50 ml.

VIA: I.M.



SUPLEMENTO MINERAL Con tanino

COMPOSICIÓN

Sulfato de cobre 5%
Sulfato de hierro 9%
Sulfato de magnesio 10%
Sulfato de manganeso 1.5%
Sulfato de cobalto 1%
Sulfato de zinc 1%
Cloruro de calcio 14%
Fosfato de sodio 22%
Ioduro de potasio 0.15%
Cloruro de sodio c.s.p 100%

INDICACIONES

Animales atrasados y/o convalecientes, engorde, hacienda general, abortos por desequilibrio, hipocalcemia.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 1500 g.



BALDE ANTIEMPASTE Hidrosoluble

COMPOSICIÓN

Simeticona: 8,6%
Cloruro de Calcio: 28%
Fosfato báásico de Calcio: 12%
Oxido de Magnesio: 5%
Cloruro de Cobalto: 0,5%
Cloruro de Manganeso: 0,5%
Cloruro de Zinc: 1%
Citrato Ferroso: 1,5%
Cloruro de Sodio: 42,9%

INDICACIONES

Antiespumante. Prevención del timpanismo espumoso del bovino. Aporte complementario de minerales y oligoelementos.

PRESENTACIÓN

Balde con 4 panes.



DESINTOXICANTE

Soluble | Preventivo de la intoxicación ciánica

COMPOSICIÓN

Tiosulfato de sodio anhídrico...98%
Sulfato ferroso anhídrico.....2%

INDICACIONES

Preventivo de intoxicaciones de avenas, gramillas, sudán, sorgos y en todos los pastoreos ciánicos.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 1800 g.



FORTBLOCK Suplemento mineral proteico

COMPOSICIÓN

Afrechillo de trigo - Pellet de soja - Fosfato dicalcio
Sulfato de zinc - Oxido mangano - Oxido de magnesio
Iodato de calcio - Cloruro de sodio - Carbonato de cobalto
Selenito de sodio - Urea nutricional.

INDICACIONES:

Aporte de proteínas, vitaminas y minerales. Aumenta el consumo y digestibilidad de pastos secos. Reduce las pérdidas de peso en estación invernal. Estimula el apetito por incrementar la actividad ruminal. Corderos más pesados al destete. Reduce la necesidad de alimentos.

PRESENTACIÓN

Bloque de 10 kg.



FORTBLOCK Suplemento mineral Melaza - Urea

COMPOSICIÓN

Afrechillo de trigo - Pellet de soja - Fosfato dicalcio - Sulfato de zinc - Oxido mangano - Oxido de magnesio
Iodato de calcio - Cloruro de sodio - Carbonato de cobalto
Selenito de sodio - Urea nutricional.

INDICACIONES:

Aporta energía, minerales y vitaminas. Estimula el desarrollo de los microorganismos del rumen aumentando el consumo y digestibilidad de los pastos secos. Reduce las pérdidas de peso en la estación invernal. Incrementa el porcentaje de preñez. Terneros más pesados al destete. Reduce la necesidad de alimentos.

PRESENTACIÓN

Bloque de 20 kg.





**BALDE CONTROL MOSCA
DE LOS CUERNOS**
Hidrosoluble

COMPOSICIÓN

Metroprene - Calcio - Magnesio - Fósforo - Azufre - Hierro - Cobre - Zinc Yodo - Cobalto - Saborizantes hidrosolubles

INDICACIONES

Regula el crecimiento de los insectos. Altera el ciclo de la mosca de los cuernos, desaparece la postura de huevos de la mosca en la bosta.

PRESENTACIÓN

Balde con 4 panes.



PANES PARA LAMER
Suplemento mineral vitamínico
con Urea y Magnesio

COMPOSICIÓN

Sulfato de cobre.....	5%
Sulfato de hierro	9%
Sulfato de magnesio	15%
Sulfato de manganeso	1.5%
Sulfato de cobalto	1%
Sulfato de zinc	1%
Vitamina A	2220 UI
Vitamina D3	220 UI
Cloruro de calcio.....	14%
Ioduro de potasio	0.15%
Cloruro de potasio	2.5%
Fosfato de sodio.....	22%
Urea	15%
Selenito de sodio.....	15%
Cloruro de sodio c.s.p	100%

INDICACIONES

En casos de hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, acetonemia. Aumenta los índices reproductivos. Mejora la asimilación de la alimentación. Favorece la correcta formación del hueso. Importante para el cumplimiento de los diferentes estadios de la producción (carne, leche).

PRESENTACIÓN

Bloque de 10 kg.



**BALDE SUPLEMENTO MINERAL
c/ AD3 - B12**

COMPOSICIÓN

Sulfato de cobre.....	10 %
Sulfato de hierro	9%
Sulfato de magnesio	45%
Sulfato de manganeso	1.5%
Sulfato de cobalto	1%
Sulfato de zinc	1%
Cloruro de calcio	35%
Ioduro de potasio	0.15%
Cloruro de potasio	2.5%
Fosfato de sodio	225
Riboflavina	1.2%
Niacina	0.56%
Ácido pantoténico	0.34%
Vitamina B12	0.18 mg.
Vitamina A	2200 UI
Cloruro de sodio c.s.p	100%

INDICACIONES

Para animales en estado de preñez, crianza, destete y engorde

PRESENTACIÓN
Balde con 4 panes



NUESTRO LABORATORIO EN TODO EL PAÍS

LÍNEA ANTISÉPTICO



GANAFORT 50

Antiséptico | Amonio cuaternario 50

COMPOSICIÓN

Cloruro de Alkyldimetilbencilmamonio:.....50%
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Desinfección de criaderos y bebederos, instrumentos y maquinarias de industria láctea, frigorífica y alimentación. Coadyuvante en la cura de aftas bucales y podales en vacunos y porcinos.

PRESENTACIÓN

Presentación: Bidones de 1 y 5 litros.

El producto es de uso oral, para lavado, aspersión y pediluvios.



BOVINOS PORCINOS

INSECTICIDA GANAFORT

Uso ambiental

COMPOSICIÓN

Diazinón.....40 g.
Cipermetrina..... 4 g.
Vehículo c.s.p.....100 ml.

INDICACIONES

Para ser utilizado en instalaciones como paredes, pisos y techos. NO se aplica sobre los animales.

PRESENTACIÓN

Frasco 145 ml.

Se aplica por aspersión, previa dilución, con un equipo aspersor adecuado (tipo mochila) sobre animales/instalaciones.

LÍNEA NÚCLEO



NÚCLEO BOVINO

Vitamínico mineral A-D3

COMPOSICIÓN

Vitamina A Palmitato12.000.000 U.I.
Vitamina D3.....2.200.000 U.I.
Vitamina E..... 2500 U.I.
Óxido manganoso mangánico..... 48.8 g.
Óxido cúprico..... 6 g.
Sulfato ferroso..... 125 g.
Carbonato de cobalto csp..... 5000 g.

INDICACIONES

Prevención de enfermedades carenciales.
Favorece el crecimiento, desarrollo y producción.

PRESENTACIÓN

Bolsas por 5 kg.



BOVINOS



NÚCLEO CERDO

Suplemento antibiótico | Vitamínico mineral

COMPOSICIÓN

Vitamina A (Palmitato)..... 4.500.00 U.I.
Vitamina D3..... 900.000 U.I.
Vitamina E (Alfotocoferol)..... 1.200 U.I.
Vitamina B2 1.5 g.
Ácido Pantoténico:..... 4.5 g.
Niacina 8 g.
Vitamina B12 41 mg.
Óxido Manganoso Mangánico 25 g.
Óxido Cúprico 8 g.
Óxido de Zinc 57 g.
Sulfato Ferroso 164 g.
Ioduro de Potasio 0.32 g.
BHT 62.5 g.
Bacitracina Zinc..... 10 g.
Carbonato de Calcio c.s.p..... 5 kg.

INDICACIONES:

Previene enfermedades carenciales.
Favorece el desarrollo, crecimiento y producción.

PRESENTACIÓN

Bolsas por 5 kg.



PORCINOS





GANAFORT 25

Antiséptico concentrado | Natatorios
Amonio cuaternario 25

COMPOSICIÓN

Cloruro de Alkyldimetilbencilmamonio:25%
Bicarbonato de Sodio:1%
Vehículo c.s.p:100 ml.

INDICACIONES

La primera vez, limpiar la piscina, preparando una solución a razón de 50 ml. en 5 litros de agua. No enjuagar, así se eliminan gérmenes, algas, hongos y virus (no utilizar detergente ni jabón). Posteriormente se procede al llenado según dosificación.

PRESENTACIÓN

Bidones de 1 Litro y 5 Litros

El producto es de uso oral, para lavado, aspersión y pediluvios.



ORDEÑO

Con anestésico

COMPOSICIÓN

Xilocaina:2%
Cloruro de Benzalconio:0.25%
Vehículo c.s.p:100 g.

PRESENTACIÓN

Envase x 500 ml. y 2 kg.

Se aplica localmente cubriendo gritas/heridas de la ubre.



BOVINOS



ÍNDICE DE COLORES

- ANTIPARASITARIOS
- INYECTABLES
- ANTIBIÓTICOS
- SOLUBLES
- ANTISÉPTICOS
- NÚCLEO
- CREMAS



Junín (B) | Laboratorio: Gandini 542

General Villegas (B) | Adm. y ventas: San Martín 465
03388 422167 | 0800 4440245

info@laboratorioganafort.com.ar
www.laboratorioganafort.com.ar